

ACADÉMIE DE LA ROCHELLE.

SOCIÉTÉ

DES

SCIENCES NATURELLES

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

ANNALES DE 1883.

N° 20



LA ROCHELLE

TYP. V^e MARESCHAL & MARTIN, RUE DE L'ESCALE.

1884.

FAMILLE DES BOMBINATORIDÉS.

Bombinator igné, *Bombinator igneus*, Laur.; assez commun.

Bombinator à ventre jaune, *Bombinator bombina*, Merr.; *Bufo fuscus*, Laur.

Pelobate cultripède, *Pelobates cultripes*, Gm.; commun dans les marais.

FAMILLE DES HYLIDÉS.

Rainette verte, *Hyla viridis*, Laur.; *Rana arborea*, Lin.; *Hyla arborea*, Schw.; très commune.

Grenouille verte, *Rana viridis*, Ræsel.; *Rana esculenta*, Lin.; très commune, sédentaire comme tous les batraciens.

Grenouille agile, *Rana agilis*, Thomas.

Pélodyte ponctué, *Pelodytes punctatus*, Daud.

REPTILES.

ORDRE DES OPHIDIENS.

FAMILLE DES VIPÉRIDÉS.

Pélias bérus, *Pelias berus*, Marrem.; *Vipère à trois plaques*, *Vipera cherssea*, Lin.; commun, sédentaire.

Vipère commune, *Vipera aspis*, Marr.; *Vipera berus*, Lin.; (vulgairement Aspic), assez commune, sédentaire.

FAMILLE DES DIAGRANTÉRIDÉS.

Zaménis vert-jaune, *Zamenis viridi-flavus*, Wagl.; *Coluber atravirens*, Lacep.; très commun partout, sédentaire.

Zaménis vert-jaune, var. d'Esculape, *Zamenis viridi-flavus*, var. *Æsculapi*, Sch.; *Coluber Æsculapi*, Sch.; assez rare, sédentaire.

Zaménis vert-jaune, var. glaucoïde, *Zamenis viridi-flavus*, var. *Glaucoides*, Miller.; *Coluber glaucoides*; assez rare, sédentaire.

FAMILLE DES SYNCRANTÉRIDÉS.

Tropidonote à collier, *Tropidonotus natrix*, Schl.; *Coluber natrix*, Lin.; commun, sédentaire.

Tropidonote vipérin, *Tropidonotus viperinus*, Schl.; *Coluber viperinus*, Latr.; assez commun, sédentaire.

Coronelle lisse, *Coronella levis* (*Austriacus*), Laur.; *Coluber Austriacus*, Gm.; peu commune, dans les lieux sablonneux, sédentaire.

Coronelle bordelaise, *Coronella Girundica*, Dum.; *Coluber Girundicus*, Daud.; assez rare, sédentaire.

ORDRE DES SAURIENS.

FAMILLE DES SCINCOÏDÉS OU LÉPIDOSAURIDÉS.

Seps chalcide, *Seps chalcides*, Ch. B.; *Lacerta chalcides*, Lin.; très rare.

Orvet fragile, *Anguis fragilis*, Lin. ; assez commun partout, sédentaire.

FAMILLE DES LACERTIDÉS.

Lézard des souches, *Lacerta stirpium*, Daudin ; très commun partout, sédentaire.

Lézard des sables, *Lacerta arenicola*, Daud. ; peu commun, sédentaire sur nos côtes sablonneuses.

Lézard vivipare, *Lacerta vivipara*, Daud.

Lézard vert, *Lacerta viridis*, Daud. ; assez commun partout, sédentaire.

Lézard ocellé, *Lacerta ocellata*, Daud.

Lézard à deux raies, *Lacerta bilineata*, Daud. ; très commun partout, sédentaire.

Lézard des murailles, *Lacerta muralis*, Dum. ; *Lacerta agilis*, très commun partout, sédentaire.

ORDRE DES CHÉLONIENS.

FAMILLE DES THALASSIDÉS.

Sphargis luth, *Sphargis coriacea*, Gray ; *Sphargis mercurialis*, Merr. ; un très bel individu a été pris vivant dans la rade de la Rochelle au mois de juillet 1871.

Chélonie franche, *Chelonia mydas*, Schweiger ; *Testudo viridis*, Schn. ; *Caretta esculenta*, Merr. ; rare, plusieurs ont été prises accidentellement dans notre rade, poussées sur nos côtes par les tempêtes.

Chélonie caouanne, *Chelonia caouanna*, Schw. ; rare, plusieurs ont été prises sur nos côtes.

Cistude d'Europe, *Cistudo Europæa*, Gray ; *Testudo orbicularis*, Lin.

—
OISEAUX

ORDRE DES PALMIPÈDES.

FAMILLE DES ALCIDÉS.

Pingouin torda, *Alca torda*, Lin. ; assez commun, passe en hiver, Esnandes.

Macareux moine, *Fratercula arctica*, Vieill. ; *Alca arctica*, Lin. ; assez commun, passe en hiver et au printemps, Esnandes.

Mergule nain, *Mergulus alle*, Ch. B. ; *Alca alle*, Lin. ; *Uria minor*, Briss. ; (vulgairement le petit Guillemot), très rare, passage accidentel en avril, côtes de la Rochelle.

Guillemot gryllé, *Uria grylle*, Lath. ; *Colymbus grylle*, Lin. ; (vulgairement Guillemot à miroir blanc ou grand Guillemot), assez rare, passe en hiver sur les côtes de la Rochelle.

Guillemot troïle, *Uria troïle*, Lath. ; *Colymbus troïle*, Lin. ; (vulgairement Guillemot à capuchon), assez commun en hiver sur les côtes de la Rochelle.

FAMILLE DES PODICEPIDÉS.

Grèbe huppé, *Podiceps cristatus*, Lath. ; *Colymbus cornutus*, Briss. ; assez rare, passe à l'automne, principalement aux environs de la Rochelle.