

**BATRACIENS ET REPTILES DE L'ALLIER,
DU PUY-DE-DÔME, DE LA LOIRE, DE LA HAUTE-LOIRE,
DU CANTAL ET DE LA LOZÈRE.
ESSAI DE SYNTHÈSE SUR LA RÉPARTITION DES
BATRACIENS ET REPTILES DU MASSIF CENTRAL
(FRANCE). COMPLÉMENTS I**

par

Dominique BRUGIÈRE

Résumé — La faune herpétologique du Massif Central a fait l'objet d'une mise au point récente (BRUGIÈRE, 1986). Une année de recherches supplémentaires (1986) permet de compléter les cartes de distribution déjà présentées. Un commentaire succinct accompagne les observations les plus intéressantes.

Mots-clés : Reptiles, Batraciens, répartition, Massif Central, France.

Summary — The herpetological fauna of Massif Central (France) has been recently reported (BRUGIÈRE, 1986). One more year of prospections has allowed to complete the formerly published repartition maps. A short comment follows the most interesting observations.

Key-words : Reptila, Amphibia, repartition, Massif Central, France.

I. INTRODUCTION

Depuis la parution d'une synthèse sur les Batraciens et les Reptiles du Massif Central (BRUGIÈRE, 1986) et après une saison supplémentaire de prospection, quelques éléments nouveaux peuvent être apportés ; ces compléments permettront ainsi de "boucher" quelques trous dans les cartes de répartition. La liste en est fournie ici par cartes I.G.N. au 1/50 000^e. Dans certains cas, lorsque cela semble important, la région naturelle de la découverte est mentionnée. Par ailleurs, quelques nouveautés ont nécessité un commentaire particulier.

II. BATRACIENS

— Salamandre tachetée (*Salamandra salamandra*)

Des larves de Salamandre ont été trouvées à 1 310 m d'altitude dans le Haut Allier, en Lozère (Moure de la Gardille).

— Triton crêté (*Triturus cristatus*)

L'espèce a été notée en abondance (larves) en Haute-Loire, sur la carte d'Yssingeaux à Rosières. Côté Ardèche, ce triton a été observé dans plusieurs mares du Haut Vivarais (carte de Tournon) sur les communes de Cheminas et Eclassan. Toutefois, les prospections engagées au sud de la vallée du Doux, dans le Vivarais, ainsi que sur le plateau du Coiron se sont avérées infructueuses.

— Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*)

Actualisation de la donnée de BRASSAUX (1882) sur la carte de Lacapelle-Marival (Lot), mais aussi découverte de l'espèce sur celle de Figeac (Lot), dans les deux cas sur la partie orientale du causse de Gramat où elle est fréquente dans les mares.

Dans le Puy-de-Dôme, le Sonneur m'a été signalé par BRUNHES (in litt.) dans le Bois de Monges (ouest Livradois, près Vic-le-Comte) et je l'ai trouvé abondant dans les cavités rocheuses des gorges de l'Allier à Orbeil. Dans ce cas, il s'agit du même habitat que l'espèce fréquente tout le long des gorges de la Loire (BRUGIERE, 1986). Dans la Loire, j'ai noté plusieurs sujets dans les ornières de la plaine du Forez, sur Boisset-les-Montrond.

— Pélobate cultripède (*Pelobates cultripes*)

J'ai relaté la capture de têtards de Pélobates cultripèdes sur le causse de Blandas (Gard) à l'altitude remarquable de 560 m, donc dans un environnement ne convenant apparemment guère aux exigences de l'espèce. Aussi, faut-il relever l'observation similaire faite par MARTENS (1986) qui a également noté des têtards de cet anou sur le causse de Larzac, à 645 m d'altitude (Hérault). Dans les deux cas, l'espèce se trouve de toute évidence à la limite nordique de son aire de distribution.

— Pélodyte ponctué (*Pelodytes punctatus*)

Le Pélodyte est fréquent en Basse Ardèche (cartes de Largentière, Bessèges, Aubenas et Bourg-St-Andéol). Dans le Lot, actualisation de la donnée pour la carte de Lacapelle-Marival (BRASSAUX, 1882), ainsi que celle sur Gramat. Ces deux indices se rapportent au causse de Gramat où l'espèce est fréquente par places.

— Rainette verte (*Hyla arborea*)

Deux nouvelles stations ont été découvertes dans des "narses" ⁽¹⁾ sur les plateaux basaltiques aux confins du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et du Cantal : à Saint-Gervazy dans le Puy-de-Dôme à 707 m d'altitude et à Massiac dans le Cantal à 690 m. Cette dernière donnée est actuellement la seule mention de la Rainette verte dans le Cantal. On remarquera que ces deux nouvelles stations, ainsi que celle d'Espalem (Haute-Loire) (BRUGIERE, 1986), sont très proches de la vallée de l'Alagnon. Enfin, plusieurs colonies ont été repérées dans la partie nord du causse de Limogne (Aveyron) (communes de Villeneuve et de Causse-et-Diège).

— Rainette méridionale (*Hyla meridionalis*)

En Basse Ardèche, la Rainette méridionale n'est fréquente que par places. Elle a été notée en sus sur les cartes de Largentière et Bessèges.

— Grenouille rieuse (*Rana ridibunda*) ou Grenouille de Perez (*Rana perezi*)

Des grenouilles présentant des caractères communs à ces deux espèces ont été trouvées en sus sur les cartes de Montélimard, Largentière, Valréas et Crest. On remarquera que ces nouvelles données ne font que compléter l'aire déjà schématisée (BRUGIERE, loc.cit.).

— Grenouille agile (*Rana dalmatina*)

Un remarquable regroupement de reproduction a été découvert au coeur de la Combrailles, à Chapdes-Beaufort (Puy-de-Dôme), où l'espèce n'était pas connue.

(1) narse : terme régional définissant une retenue d'eau naturelle, souvent de forme circulaire, sur les plateaux volcaniques du Massif Central.

III. REPTILES

— Lézard des souches (*Lacerta agilis*)

Le Lézard des souches a été observé cet été sur le plateau de la Viadène (Aveyron-carte d'Entraygues-sur-Truyère).

— Lézard vivipare (*Lacerta vivipara*)

Ce Lézard a été noté au bord de plusieurs étangs de la Combrailles, ce qui prolonge vers le nord-ouest son aire de distribution (cartes de St-Gervais-d'Auvergne et de Pontgibaud).

— Lézard espagnol (*Podarcis hispanica*)

Les mentions que j'ai faites pour les cartes de Valence, Serrières et Vienne (vallée du Rhône et contreforts du Pilat jusqu'au département de la Loire) (BRUGIERE, loc.cit.) permettaient d'étendre largement en direction du nord nos connaissances sur la distribution du Lézard espagnol en France. Les identifications confirmées à l'époque par M. CHEYLAN viennent également de l'être par GUILLAUME et GENIEZ (1986) qui, en 1985, ne le signalaient pas au-delà de la vallée de l'Ardèche. Un bond de 80 km en direction du nord était ainsi fait.

La station la plus nordique indiquée par ces auteurs (St-Pierre-de-Boeuf-Parc du Pilat, selon MAGRANER) n'est autre que celle que j'ai déjà signalée presque un an auparavant (sujets capturés en 1985 à Malleval-Loire) (BRUGIERE, 1986) (les communes de Malleval et St-Pierre-de-Boeuf étant contiguës et à la même latitude). La connaissance de la distribution de l'espèce n'a donc pas progressé. Néanmoins, je peux citer en sus ce Lézard en Ardèche sur les cartes de Tournon et Privas (vallée du Rhône et de ses affluents rive droite ; contreforts du Coiron), ainsi qu'en Lozère sur celle de Mende (observé à Balsièges dans la vallée du Lot où il n'avait pu l'être en 1985). Tant dans le nord de l'Ardèche que dans le sud de la Loire, ce Lézard ne progresse que très peu à l'intérieur du Massif Central, colonisant uniquement les vallées à basse altitude. Pour terminer, remarquons comme l'écrivent GUILLAUME et GENIEZ (1986) que les sujets les plus nordiques présentent souvent un dessin plus contrasté, des réticulations noires plus développées et une linéation dorsale plus marquée que ceux de Basse Ardèche, des Grands Causses ou des Cévennes.

— Couleuvre verte et jaune (*Coluber viridiflavus*)

Les indications qui m'avaient été fournies pour la vallée de l'Alagnon (Cantal et Haute-Loire), notamment par CHALIER, de même que d'anciennes observations personnelles que j'avais préféré omettre tant elles paraissaient en contradiction avec le reste de la distribution de l'espèce dans le Massif Central, ont été confirmées ce printemps. En dépit de toute logique, l'espèce occupe donc la vallée de l'Alagnon (cartes de Murat, St-Flour et Massiac) mais est aussi à retenir pour la Limagne brivadoise (carte de Brioude- observée en 1979 en bordure d'Allier à Lamothe -43). Elle fait donc partie de la faune de la Haute-Loire, mais aussi sans doute de celle du Puy-de-Dôme (à rechercher dans l'extrême sud du département, en particulier dans les affluents de l'Alagnon).

— Coronelle lisse (*Coronella austriaca*)

En complément des données déjà indiquées (BRUGIERE, loc.cit.) pour la carte de Nant, j'ai noté l'espèce dans le Massif de l'Aigoual-Lingas à 1 220 m d'altitude dans le Gard. De plus, elle m'a été signalée à seulement 750 m d'altitude dans cette même région.

— Couleuvre d'Esculape (*Elaphe longissima*)

Observation intéressante, le 20 juin 1986, d'un sujet écrasé dans le sud de la

Sologne bourbonnaise (bois de Jaligny-Allier), loin de toute autre station connue.

— Vipère aspic (*Vipera aspis*)

L'espèce a été observée cet été sur le causse de Gramat, dans le Lot, où elle semble rare.

— Cistude d'Europe (*Emys orbicularis*)

Confirmation de la bonne fréquence de l'espèce sur les vieux étangs de Sologne bourbonnaise, avec son observation sur six nouveaux étangs (non prospectés antérieurement).

III. LISTE DES NOUVEAUTÉS

En complément du travail déjà cité (BRUGIERE, 1986) et pour lequel, lors de l'élaboration des cartes de distribution la trame des cartes I.G.N. au 1/50 000e avait été utilisée, il faut ajouter :

- Salamandre tachetée (*Salamandra salamandra*) : Lacapelle-Marival.
- Triton alpestre (*Triturus alpestris*) : Charlieu.
- Triton crêté (*Triturus cristatus*) : Yssingeaux, Tournon.
- Triton palmé (*Triturus helveticus*) : La Roche-Canillac, Valence, Tournon, Largentière.
- Triton marbré (*Triturus marmoratus*) : Ussel, La Roche-Canillac, Argentat.
- Alyte (*Alytes obstetricans*) : La Roche-Canillac, Entraygues-S/T., Bessèges, Largentière, Tournon, Aubenas.
- Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*) : Figeac, Issoire, Lacapelle-Marival.
- Pélodyte ponctué (*Pelodytes punctatus*) : Lacapelle-Marival, Largentière, Bessèges, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Gramat, Najac.
- Crapaud commun (*Bufo bufo*) : Bessèges, Aubenas.
- Crapaud calamite (*Bufo calamita*) : Lacapelle-Marival, Najac, Bourg-St-Andéol, St-Etienne.
- Rainette verte (*Hyla arborea*) : Besse-et-St-Anastaise.
- Rainette méridionale (*Hyla meridionalis*) : Largentière, Najac, Bessèges.
- Grenouille verte (*Rana kl. esculenta*) et Grenouille de Lessona (*Rana lessonae*) : Dun-sur-Auzon, Craponne-sur-Auzon.
- Grenouille rieuse (*Rana ridibunda*) ou Grenouille de Perez (*Rana perezi*) : Montélimar, Largentière, Valréas, Crest.
- Grenouille agile (*Rana dalmatina*) : Pontgibaud, Argentat.
- Orvet (*Anguis fragilis*) : Génolhac.
- Lézard des souches (*Lacerta agilis*) : Entraygues-sur-Truyère.
- Lézard vert (*Lacerta viridis*) : Bourg-St-Andéol, Aubenas, Yssingeaux.
- Lézard vivipare (*Lacerta vivipara*) : St-Gervais-d'Auvergne, Pontgibaud.
- Lézard espagnol (*Podarcis hispanica*) : Mende, Tournon, Privas.
- Lézard des murailles (*Podarcis muralis*) : Aubenas.
- Couleuvre verte et jaune (*Coluber viridiflavus*) : Massiac, St-Flour, Brioude, Valence, Lacapelle-Marival.
- Coronelle lisse (*Coronella austriaca*) : Le Puy.
- Couleuvre d'Esculape (*Elaphe longissima*) : Lacapelle-Marival, St-Pourçain-sur-Sioule.
- Couleuvre vipérine (*Natrix maura*) : Aubenas, Bourg-St-Andéol, Issoire.
- Couleuvre à collier (*Natrix natrix*) : Tournon, Lacapelle-Marival, St-Gervais-d'Auvergne.
- Vipère aspic (*Vipera aspis*) : Figeac, Tournon, Rodez.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BRASSAUX, P. (1882) — Batraciens observés à Lacapelle-Marival (Lot) en 1881. *Fe. Jeun. Nat.*, 12, 137 : 64.
- BURGIERE, D. (1986) — Batraciens et Reptiles de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Loire, de la Haute-Loire, du Cantal et de la Lozère. Essai de synthèse sur la répartition des Batraciens et Reptiles du Massif Central. *Centre Ornithologique Auvergne* : 158 p.
- GUILLAUME, C.P. et GENIEZ, P. (1986) — Description d'une sous-espèce de *Podarcis hispanica* (Sauria, Lacertidae) : *Podarcis hispanica cebennensis*, GUILLAUME et GENIEZ in FRETEY, 1986. *Bull. Soc. Herp. Fr.*, 39 : 1-15.
- GUILLAUME, C.P., WOLFF, J. et GENIEZ, P. (1985) — L'électrophorèse, un critère de terrain ? Nouvelles données sur *Podarcis hispanica* en France. *Bull. Soc. Herp. Fr.*, 33 : 16-34.
- MARTENS, H. (1986) — Sur la répartition altitudinale de *Pelobates cultripipes* (CUVIER, 1829) (*Amphibia, Pelobatidae*) en France. *Bull. Soc. Herp. Fr.*, 39 : 20.

Accepté le 22/05/1987

Dominique BRUGIERE
39 rue Sidi-Brahim
03200 VICHY (FRANCE)