К герпетофауне окрестностей Шортанды (Центральный Казахстан)

Во время обследования сельскохозяйственных ландшафтов в окрестностях посёлка Шортанды и Казахского научно-исследовательского института зернового хозяйства (КазНИИЗХ), в 60 км севернее г. Астаны, с 28 июля по 12 августа 2000 г. установлено обитание 2 видов земноводных и 2 видов пресмыкающихся.

Остромордая лягушка (*Rana arvalis*). Немногочисленный вид, населяющий степные пруды и небольшие водохранилища с илистыми отложениями берегами, поросшими тростником и рогозом. Пункты встреч: 30-31 июля – 10 км южнее пос. Шортанды, одиночки по заболоченным берегам пруда в лесополосе вдоль железной дороги; 7 августа – 1 сеголеток, здесь же; 31 июля и 1 августа – 1 сеголеток и 1 взрослая особь на пруду с тростниками в Братской балке, в 20 км юго-восточнее пос. Шортанды; 2 августа – 2 годовалых особи в пойме р. Колутон, в 5 км северо-восточнее с. Барышевка; 5 августа – 1 взрослая особь на верхнем водохранилище в истоках р. Сарыкамыс между посёлками Шортанды и Первомайский (взята в коллекцию).

Зеленая жаба (*Bufo viridis*). Малочисленный вид, встреченный в населенных пунктах, где предпочитает огороды и пруды. Пункты встреч: 2 августа – 2 взрослые особи пойманы в коллекцию в колодце в центре с. Барышевка (10 км севернее пос. Шортанды по трассе на Акколь); 7 августа – 1 взрослая особь с огорода пос. Шортанды; 8 августа – 1 взрослая, раздавленная на асфальтовой дороге в пос. Шортанды.

Прыткая ящерица (*Lacerta agilis*). Наиболее обычна по сохранившимся участкам типчаково-полынной степи, среди которой встречаются фрагментарные заросли кустарниковой полыни или куртины спиреи. Пункты встреч: 28 июля – взрослая самка в 8-10 км юго-западнее пос. Шортанды среди пшеничных полей КазНИИЗХ в котловане с водой на глинистом бугре, поросшем полынью; 30 июля – 1 взрослая самка на опушке соснового леса в 10 км южнее пос. Шортанды по трассе на Астану; 31 июля и 1 августа – 2 взрослые самки, 20 км юго-восточнее пос. Шортанды на заповедной целине КазНИИЗХ среди фрагментарных зарослей кустарниковой полыни; 4 августа – здесь же 1 взрослый самец.

Водяной уж (*Natrix tessellata*). Редкий вид. Единственная встреча 1 взрослого ужа 4 августа на пруду с тростниками в Братской балке в 20 км юго-восточнее пос. Шортанды.

Среди заповедной целинной степи КазНИИЗХ, а также на примыкающих участках низкотравных типчаково-полынных степей, используемых в качестве пастбищ, отмечено обитание только прыткой ящерицы. На высокотравных залежах в возрасте до 5-7 лет как земноводные, так и пресмыкающиеся нами не встречались. На водоемах в сельскохозяйственных ландшафтах обитают остромордая лягушка, зеленая жаба и водяной уж. Следует отметить, что в окрестностях Шортанды не найдена степная гадюка (*Vipera renardi*), характерная для степных ландшафтов Северного Казахстана. Не встречали её в последнем десятилетии опрошенные сотрудники КазНИИЗХ и местные жители.

Н.Н. Березовиков,
Алматы

Майна-альбинос в городе Алматы

В западной части города Алматы в квадрате улиц Абая, Саина, Шаляпина и Момышулы среди 9-этажных домов микрорайона Мамыр-4 11 ноября 2009 г. мной наблюдалась пара майн (*Acridotheres tristis*), из них одна нормальной окраски, вторая – белая, с темными ногами, клювом и глазами. Птицы кормились вблизи мусорных баков. В дальнейшем, вплоть до конца ноября, встречать этого альбиноса в микрорайоне больше не приходилось.

Н.Н. Березовиков,
Алматы

Расселение семиреченского фазана в пойме Чёрного Иртыша

В прошедшем десятилетии реаклиматизированный фазан (*Phasianus colchicus mongolicus*) успешно прижился и расселяется в восточной части Зайсанской котловины (Щербаков, 1995, 2009; Березовиков, 2007). В низовьях Черного Иртыша он впервые отмечен в мае 2000 г. в окрестностях села Игилик, бывш. Прииртышское (Березовиков, Самусев, 2003). В июле 2008 г. выводок фазанов был найден уже в нижнем течении Кальджира, правого притока Чёрного Иртыша (Щербаков, 2009). В 2009 г. обнаружен по Черному Иртышу в 20 км выше пос. Буран. Так, 8, 12 и 13 сентября в вечерние и утренние