

Maiella: Cásoli, m 378 s.l.m. (4 ♂♂ 2904-2908; VIII.1969; L. Leri). Lago del Sangro presso Pennadomo, m 460 (4 ♀♀ 2913-2916, 6 ♂♂ 2917-2922; VIII.1962; L. Leri).

Monti del Parco Nazionale: Valle del Sagittario tra S. Domenico e Villalago, m 700-920 s.l.m. (3 ♂♂ 2909-2911, ♀ 2912; I.V.1971; S. Bruno). Piana del Fucino, m 650 s.l.m. (3 ♂♂ 2930-2932, ♀♀ 2933-2938; 27.VII.1971; S. Bruno). Lago Fibreno, m 300 s.l.m. (5 ♂♂ 2943-2947, ♀ 2952; VIII.1970; S. Bruno). Settefrati, m 480 s.l.m. (3 ♂♂ 2959-2961, 3 ♀♀ 2962-2964; VIII.1970; S. Bruno). Picinisco, m 450 s.l.m. (3 ♂♂ 2940-2942, 4 ♀♀ 2948-2951; VIII.1970; S. Bruno). Cocullo, m 870 s.l.m. (2 ♂♂ 2985-2986; I.V.1971; S. Bruno). Dintorni di Alfedena, m 950 s.l.m. (2 ♂♂, 2 ♀♀; 29.VII.1971) (MAUGERI & SPADA, 1972). Rive del lago di Barrea, 950-1000 m (!).

Matese: Capriati, m 290 s.l.m. (2 ♂♂ 2979-2980; VI.1969; L. Marini). Piedimonte d'Alife, m 138 s.l.m. (2 ♂♂ 2872-2974; VI.1969; L. Marini). Quattroventi, m 124 s.l.m. (4 ♂♂ 2981-2984; VII.1969; L. Marini). Boiano, m 549 s.l.m. (♂ 2975, 3 ♀♀ 2976-1978; VII.1969; L. Marini). Valle di Letino, m 330-700 s.l.m. (3 ♂♂ 2969-2971; VI.1969; L. Marini).

NOME LOCALE. - E' ovunque chiamata *Lucegnula* o *Lucèrte*.

CONSIDERAZIONI. - La Lucertola campestre sembra avere sull'Appennino abruzzese una diffusione limitata e assai discontinua; è più termofila della Lucertola muraiola e di regola non supera i 600 m di altezza anche se talvolta si spinge sino a 1000 m s.l.m. *Lacerta sicula campestris* abita in genere le pendici esterne E ed W dei rilievi abruzzesi e la parte basale delle maggiori valli fluviali, ad eccezione della Piana del Fucino e della Marsica NE che sembrano ospitare popolazioni isolate e, almeno in parte, morfologicamente un pò diverse da quelle dei littorali tirrenico-adriatico e dei rispettivi preappennini. Nella fig. 12 riporto la distribuzione della *Lacerta sicula* e della *L. muralis* « a dorso bruno » nell'Appennino abruzzese in base alle mie attuali conoscenze.

*Lacerta viridis viridis* (Laurentus, 1768) (Ramarro) (fig. 13).

BIBLIOGRAFIA ABRUZZESE. - *Lacerta viridis*, FESTA 1915, p. 5 (Dintorni di Villetta Barrea nel Parco Nazionale d'Abruzzo; 10-16.VII.1914; E. Festa). *Lacerta viridis*, TORTONESE 1941-42, p. 217 (Maiella, Abruzzo; Gibelli 1884). « Ramarro », GHIGI in LANDI VITTORI 1955, p. 32 (Appennino centrale).

GEONEMIA. - La specie è un'entità mediosudeuropeo-anatolica, assente nella maggior parte della Penisola Iberica e nelle isole mediterranee, Sicilia esclusa. La ssp. *viridis*, oltre che in altri paesi europei, vive nell'Italia settentrionale e in parte di quella centrale. Dell'Appennino abruzzese ho studiato esemplari delle seguenti località:

Monti della Laga: Folignano, m 301 s.l.m. (♂ 2989; 22.VII.1964; leg. F. Perotti). Battaglia, m 692 s.l.m. (♂ 2993; 19.VII.1964; F. Perotti). Ceppo, m 1334 s.l.m. (*juv.* 2991; 24.VII.1968; S. Bruno).

Gran Sasso d'Italia: Lago di Penne, m 438 s.l.m. (♀ 2999; VII.1964; R. Patèra). Capo d'Acqua presso Capestrano, m 500 s.l.m. (♂ 3002; X.1969; R. Patèra). Lungo il Fiume Vomano presso Ortolano, m 1027 s.l.m. (*juv.* 2998; VII.1968; R. Patèra). Paganica, m 686 s.l.m. (*juv.* 2986; VII.1967; R. Marini).




FIG. 13 - Areale approssimativo di *Lacerta viridis*, entità mediosudeuropeo-anatolica. (da LANZA e POGGESI, 1971).

Monte Velino: Fiume Aterno presso Campana, m 650 s.l.m. (♂ 3000; 3.IX.1965; A. Grimaldi). Lucoli, m 800 s.l.m. (♀ 2987; 25.VII.1968; S. Bruno). S. Anatolia, m 755 s.l.m. (♂ 2992; VII.1947; A. Grimaldi).

Monte Sirente: Celano, m 825 s.l.m. (♂ 3001; 28.V.1966; Del Prete). Cerchio, m 834 s.l.m. (♀ 3005; 29.V.1966; leg. Del Prete). Secinaro, m 824 s.l.m. (*juv.* 3011; 1.VI.1966; Del Prete).

La Maiella: Pacentro, 686 s.l.m. (♀ 3013; 2.VII.1968; L. Leri). Caramanico Terme, m 600 s.l.m. (♂ 3014; 10.XI.1969; L. Leri).

Monti del Parco Nazionale: Piana del Fucino, m 650 s.l.m. (♂ 2988; VIII.1970; S. Bruno). La Cicerana, m 1400 s.l.m. (♂ 2994; VII.1969; S. Bruno).

Piana di Opi, m 1163 s.l.m. (♂ 3010; VIII.1969; S. Bruno). Il Feudo, m 1200 s.l.m. (♂ 2996; VIII.1969; G. Ferro). Val Fondillo, m 1084 s.l.m. (♂ 3007; IX.1970; S. Bruno). Macchiarvana, m 1300 s.l.m. (♂ 3008; IX.1970; S. Bruno). Valle di Rose, m 1200 s.l.m. (*juv.* 2995; VIII.1971; S. Bruno). Il Lagozzo, m 1110 s.l.m. (♂ 3003; VII.1971; S. Bruno). Val Canneto, m 1037 s.l.m. (♀ 3004; VIII.1970; S. Bruno). Settefrati, m 781 s.l.m. (♀ 3012; VIII.1970; S. Bruno). Villalago, m 917 s.l.m. (*juv.* 3009; V.1969; S. Bruno). Cocullo, m 870 s.l.m. (♀ 2997; V.1969; S. Bruno). Monte Amaro, m 1750 s.l.m., sopra la Valle delle Palanche (♂ 6109; VIII.1971; S. Bruno). Dintorni di Alfedena, m 910 s.l.m.; ♂ 31.III.1972 (MAUGERI & SPADA, 1972).

Matese: S. Gregario Matese, m 740 s.l.m. (♂ 3076; VIII.1968; R. Marini). Roccamandolfi, m 819 s.l.m. (♀ 3017; VIII.1968; R. Marini). Lago del Matese, m 1120 s.l.m. (♂ 3015; VIII.1968; L. Marini).

NOME LOCALE. - Nella Marsica, come in molte altre zone dell'Appennino abruzzese, è chiamato generalmente *Ragano* o più comunemente *Ràchene*.

CONSIDERAZIONI. - Il Ramarro, probabilmente comune e diffuso in tutto l'Appennino abruzzese fino a 600 m di quota, diventa sporadico e assai localizzato da questa altitudine a oltre i 1700 m s.l.m.

#### Famiglia SCINCIDAE Gray 1825

#### Genere *Chalcides* Laurentus 1768

*Chalcides chalcides chalcides* (Linnaeus, 1758) (*Luscengola*) (fig. 14).

BIBLIOGRAFIA ABRUZZESE. - *Chalcides trydactylus*, GHIGI in LANDI VITTORI 1955, p. 32 (Isola del Gran Sasso d'Italia e in varie località delle provincie di L'Aquila, di Chieti e di Teramo).

GEONEMIA. - La specie è un'entità mediterranea occidentale. La ssp. *chalcides* è propria dell'Italia peninsulare, dell'Elba, della Sicilia e, con molto probabilità, anche della Sardegna (LANZA, 1968; LANZA & POGGESI, 1971). Dell'Appennino abruzzese ho esaminato esemplari provenienti dalle seguenti località:

Monti della Laga: Folignano, m 301 s.l.m. (2 ad. 4023-2024; 22.VII.1964; F. Perotti). Lago di Scandarello, m 868 s.l.m. (8 ad. 4009-4016; VI.1968; F. Perotti).

Gran Sasso d'Italia: Paganica, m 686 s.l.m. (2 ad. 4030-4031; VII.1967; R. Marini). Lago di Penne, m 438 s.l.m. (4081 *juv.*; VII.1966; R. Patèra). Cappito, m 700 s.l.m. (6 ad. 4017-4022; 2.IX.1965; R. Patèra).

Monte Velino: Piano di Campo Felice, m 1521 s.l.m. (*juv.* 4032; 26.VII.1968; S. Bruno).